



COMUNICACIONES PROPUESTAS PARA LAS XII JORNADAS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE LA C.A.V A TRAVES DE EKALME – SEMES EUSKADI.org

Nº Presentación: 007/112007

Nombre: Eunate
Apellidos: Arana Arri
Centro_de_Trabajo: Hospital de Cruces
Localidad: Barakaldo
Codigo_Postal: 48903
Provincia: Bizkaia
Preferencia: Indiferente
Titulo: **CARACTERISTICAS DE LOS PACIENTES CON CELULITIS DADOS DE ALTA EN UN SERVICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL TERCIARIO**
Fecha publicación: 4 de Septiembre de 2007
Redactor: Arana-Arri E., Lekerika N., García de Vicuña A., Blázquez J., Cuesta M. y Oñate J.

Resumen: **CARACTERISTICAS DE LOS PACIENTES CON CELULITIS DADOS DE ALTA EN UN SERVICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL TERCIARIO**

OBJETIVO:

Analizar las características clínico-epidemiológicas y la evolución de los pacientes con celulitis, atendidos en el servicio de urgencias de un hospital terciario.

METODOLOGÍA:

Estudio observacional retrospectivo realizado en el área de cobertura del Hospital de Cruces durante 6 meses (marzo-agosto de 2007). Se incluyeron pacientes atendidos en el servicio de urgencias dados de alta a su domicilio con diagnóstico de celulitis. Se recogieron datos epidemiológicos, clínicos y de evolución, de la historia clínica, el informe de alta y la hoja de tratamiento. Se realizó un análisis de frecuencias para las variables nominales y un análisis descriptivo de tendencia central para las variables cuantitativas.

RESULTADOS:

Se recogieron finalmente 89 casos, con una edad media de $58,66 \pm 20,69$ (Rango: 14-96), de ello el 56,2% eran mujeres.

El 3,4% de las celulitis se trataron de enfermedad profesional.

Tan solo el 1,1% de los pacientes presentaba fiebre y el 28,09% febrícula.

El 37,1% presentaban comorbilidad, destacando en primer lugar la diabetes mellitus (30,3%), seguida de la insuficiencia venosa (27,3%) y la arteriopatía periférica (12,1%).

El 39,3% tenían puerta de entrada, principalmente por traumatismo (71,7%).

Se solicitó analítica en el 76,4% de los casos. De las analíticas solicitadas el 17,6% presentaban leucocitosis con desviación izquierda.

En cuanto a los reactantes de fase aguda la PCR media fue de $6,2 \pm 6,39$ (Rango: 0,10-26,40) y la VSG media de $47,1 \pm 21,6$ (Rango: 5-84). Al 32,6% de los pacientes se les solicitó dímeros siendo positivos en el 68,9%.

Las pruebas de radiodiagnóstico solicitadas no evidenciaron ninguna patología añadida.

El 57,3% de los pacientes recibieron tratamiento antibiótico intravenoso previo al alta.

Casi la mitad de los pacientes (48,2%) fueron dados de alta con amoxicilina/clavulánico, seguido de cloxacilina (34,1%) y levofloxacin (10,6%).

Al 13,5% de los pacientes se les modificó el tratamiento antibiótico por mala evolución y el 11,2% necesitaron reingreso.

Los datos clínicos y analíticos de los pacientes con mala evolución no presentaban diferencias estadísticamente significativas respecto a los pacientes con buena evolución.

El manejo antibiótico recibido fue semejante (el 70% recibieron tratamiento antibiótico hospitalario intravenoso previo al alta y se les trató con cloxacilina y amoxicilina/clavulánico).

El 50% de los pacientes con mala evolución presentaban comorbilidad.

CONCLUSIONES:

La celulitis es una enfermedad relativamente frecuente en los servicios de urgencias, la cual no suele presentar en su inicio alteraciones analíticas o clínicas importantes, si por el contrario comorbilidad. No obstante un porcentaje no desdeñable requiere reingreso o

intensificación/modificación del tratamiento inicial.